

2019 年度 後期 定期試験 (問題 兼 解答用紙)

開講学部	評点小計
理工学部	

評点

問題枚数	両面印刷	別紙解答用紙	試験時間	試験科目名		クラス	出題者
2	有	なし	80分	代数学 5 <small>月曜 1 時限, 教科書: Original</small> (§§1-9)		A, B	大西良博
持込許可物件	所属学部	所属学科	学年	学籍番号 (9桁)		氏名	
なし	理工学部	数学科	年				

注意 1. 最終的な答に至る途中の説明をできるだけ詳しく書くこと。最終結果だけでは得点できない。  
 注意 3. 試験場の静粛を保つために、退場は開始 60 分後の時点の一回限りとする。

注意 2. 学生証、記名用のペン、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム以外は机の上に置かないこと。

1 (10点)  $p$  を素数とし、 $K$  は標数  $p$  の体とする。任意の元  $a, b \in K$  に対し、次が成り立つことを示せ。

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

4 (15点)  $f(x) = x^3 + 3x + 2$  は  $\mathbb{F}_5[x]$  の既約多項式である。これの根の 1 つを  $\alpha$  とし  $K = \mathbb{F}_5(\alpha)$  とせよ。このとき、 $\alpha^2 + 1$  の逆数を  $\alpha$  の 2 次以下の多項式で表せ。

2 (15点) 体の拡大  $L/K$  と中間体  $M_1, M_2$  があつて  
 $[M_1 : K] = m_1, [M_2 : K] = m_2, \gcd(m_1, m_2) = 1$   
 とせよ。このとき  $M_1 \cap M_2 = K$  であることを示せ。

5 (15点) 次の体の間の包含関係を Hasse 図で示せ。  
 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega), \mathbb{Q}(\sqrt{3}i), \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}), \mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\sqrt{3}i)$ .  
 また、隣接する体の間の拡大次数も求め書き入れよ。  
 但し  $i$  は虚数単位で  $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ .

3 (10点) 代数的拡大  $L/K$  に対し、 $L \supset R \supset K$  なる環  $R$  は体であることを示せ。

学籍番号 (9桁)	氏名

6 (5点) 体  $k$  と不定元  $t$  について,  $K = k(t^5)$ ,  $L = k(t)$  とせよ.

- (1)  $[L : K]$  はいくつか.
- (2)  $\alpha = t^2 + t + 1$  とおく.  $K(\alpha) = L$  であることを示せ.  
(Hint: まとめの (13).)
- (3)  $t$  を  $t^5$  と (2) の  $\alpha$  の有理式で具体的に書け.  
(Hint:  $t$  が  $\beta = \alpha - 1$  と  $t^5$  で表せればよい.  $t\beta, \beta^2, \beta^3$  を計算してみる.)

学籍番号 (9桁)	氏名

8 (10点) 体  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  の自己同型をすべて求めよ.

9 (10点)  $K$  を体,  $\alpha, \beta$  を  $K$  上代数的な元とする. このとき,  
 $\text{irr}(\alpha, K, x) = \text{irr}(\alpha, K(\beta), x) \iff \text{irr}(\beta, K, x) = \text{irr}(\beta, K(\alpha), x)$   
であることを示せ.

7 (10点) 代数的拡大  $L/K$  とその 2 つの真の部分体  $M_1, M_2$  で次の様な例を挙げよ.  $[M_1 M_2 : M_1] < [M_2 : M_1 \cap M_2]$ .

学籍番号 (9桁)	氏名

## 記号

$\mathbb{N}$  … 自然数全体,  $\mathbb{Z}$  … 整数全体のなす環,  $\mathbb{Q}$  … 有理数全体のなす体,  
 $\mathbb{R}$  … 実数全体のなす体,  $\mathbb{C}$  … 複素数全体のなす体.  $\omega = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$ .

## 練習事項のまとめ

- (1) 体  $L$  の部分集合  $K$  が  $L$  の演算に関して体であるとき,  $K$  を  $L$  の部分体. あるいは  $L$  は  $K$  の拡大といひ, この状況を体の拡大  $L/K$  と記す.
- (2) 体の拡大  $L/K$  に対して  $K$  上の vector 空間としての  $L$  の次元を  $L/K$  の拡大次数と呼び  $[L : K]$  で表す. 3 つの体  $K \subset M \subset L$  について  $[L : K] = [L : M][M : K]$ .
- (3) 体の拡大  $L/K$  について, 任意の  $\alpha \in L$  がある  $f(x) \in K[x]$  の根であるとき,  $L/K$  を代数的拡大と呼ぶ.
- (4) 体の拡大  $L/K$  について,  $[L : K] < \infty$  のとき, これを有限次拡大と呼ぶ.
- (5) 体  $K$  が体  $M$  の部分体で,  $M$  が体  $L$  の部分体であるとき,  $M$  を  $L/K$  の中間体と呼ぶ.
- (6) 体  $L$  とその部分体  $K$  および  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$  に対し,  $K$  のすべての元と  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  をすべてを含む最小の体を  $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  と記す. これは  $K$  に係数をもつ様な  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  の有理式の全体に他ならない.
- (7) ある体  $L$  がその部分体  $K$  と  $\alpha \in L$  によつて, 上の記法で  $L = K(\alpha)$  と書けるとき,  $L$  は  $K$  の単純拡大であるといはれる.
- (8) 2 つの部分体の共通部分は再び体であるから, どんな体  $K$  についても, それに含まれる最小の体が存在する. それを素体と呼ぶ. 素体は有理数体  $\mathbb{Q}$  か  $p$  元体  $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  ( $p$  は素数) に同型である.
- (9) 体  $K$  の積に関する単位元  $1$  をいくつか加へて  $0$  になるとき, その最小の個数は  $K$  の標数といはれ, それは素数である.  $1$  をいくつ加へても  $0$  にならない場合は, 標数は  $0$  であるといふ.  $K$  標数を  $\text{char } K$  と記す. 前者の場合は素体が  $\mathbb{F}_p$  であり, 後者の場合の素体は  $\mathbb{Q}$  である.
- (10) 拡大  $L/K$  と  $\alpha \in L$  について,  $\alpha$  を根とし, 最高次係数が  $1$  であり, 次数が最小な多項式  $f(x) = K[x]$  が唯一つ存在し, それを  $\alpha$  の最小多項式と呼んで  $\text{irr}(\alpha, K, x)$  で表す.
- (11) 拡大  $L/K$  と中間体  $M_1, M_2$  について,  $M_1$  と  $M_2$  を含む最小の部分体を  $M_1 M_2$  または  $M_2 M_1$  と書いて,  $M_1$  と  $M_2$  の合成体と呼ぶ. また, 拡大  $M_1 M_2 / M_1$  を拡大  $M_2 / K$  の  $M_1$  による持ち上げと呼ぶ.
- (12) 体  $K$  を含む体  $\Omega$  上に代数的拡大が存在しないとき,  $\Omega$  は代数的閉体といはれ, さらにもし,  $\Omega/K$  が代数的拡大であるならば  $\Omega$  は  $K$  の代数的閉包といはれる. 任意の体  $K$  に対し, その代数的閉包が存在し, すべて同型である. それを一般に  $\bar{K}$  と記す.
- (13) 体の拡大  $L/K$  が  $\alpha$  あり,  $\alpha, \beta \in L$  とせよ.  $[K(\alpha) : K] = m$ ,  $[K(\beta) : K] = n$ ,  $\text{gcd}(m, n) = 1$  ならば  $[K(\alpha, \beta) : K] = mn$  である.
- (14) 多項式  $f(x) \in K[x]$  のすべての根で  $K$  上される様な体を  $f(x)$  の最小分解体といふ.
- (15) 拡大  $L/K$  が, どんな既約多項式  $f(x) \in K[x]$  も  $L$  内に  $1$  つ根を持てば,  $f(x)$  が  $L$  上  $1$  次式のみ積に分解する, という性質を持つとき,  $L/K$  は正規拡大であるといはれる.
- (16) 正規拡大の“底上げ”や持ち上げは正規拡大である. また  $K$  上の  $2$  つの正規拡大の合成体はまた  $K$  上の正規拡大である.
- (17) 多項式  $f(x) \in K[x]$  が重根を持たないとき,  $f(x)$  は分離的であるといはれる. 拡大  $L/K$  において,  $\alpha \in L$  が  $K$  上の分離的多項式の根であるとき  $\alpha$  は  $K$  上分離的であるといはれ, さらに, すべての  $\alpha \in L$  が  $K$  上分離的であるとき,  $L/K$  を分離的拡大と称する.
- (18) 分離的拡大の持ち上げは分離的拡大である. また  $K$  上の  $2$  つの分離的拡大の合成体はまた  $K$  上の分離的拡大である.
- (19) あらゆる代数的拡大  $L/K$  が分離的である様な体  $K$  は完全体と呼ばれる. 標数が  $0$  である体や有限体は完全体である.
- (20) 代数的拡大  $L/K$  について,  $L$  から  $\bar{K}$  への中への  $K$  上の同型の個数を  $[L : K]_s$  と記す.  $\text{char } K = p > 0$  のとき, これは  $p$  の冪になる.
- (21) 分離的拡大は単純拡大である.
- (22) 正規かつ分離的な代数的拡大を Galois 拡大と呼ぶ.
- (23) 有限次 Galois 拡大  $L/K$  とその Galois 群  $G = \text{Gal}(L/K)$  について,  $\mathcal{F}(L/K)$  を  $L/K$  の中間体の全体  $\mathcal{G}(G)$  を  $G$  の部分群の全体とせよ. 各  $H \in \mathcal{G}(G)$  に対し  $L^H = \{\alpha \in L \mid \alpha^g = \alpha \ (\forall g \in H)\}$ , 各  $M \in \mathcal{F}(L/K)$  に対し  $G^M = \{\sigma \in G \mid \sigma^g = \alpha \ (\forall \alpha \in M)\}$  と記す. このとき  $G^M = \text{Gal}(L/M)$  である.
- (24) Galois の基本定理 1  
 (23) の状況下で,  $\varphi : H \rightarrow L^H$  は  $\mathcal{G}(G)$  から  $\mathcal{F}(L/K)$  への包含関係を逆転させる全単射であり, 逆写像は  $\varphi^{-1}(M) = G^M$  で与えられる.
- (25) Galois の基本定理 2  
 (23) の状況下で,  $M \in \mathcal{F}(L/K)$  について次が成り立つ.  
 (1)  $\tau \in \text{Gal}(L/K)$  に対し,  $\tau \text{Gal}(L/M)\tau^{-1} = \text{Gal}(L/M^\tau)$ .  
 (2)  $M$  は  $K$  の Galois 拡大  $\iff \text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ .  
 (3) (2) の両側が成り立つとき,  $\text{Gal}(M/K) \simeq \text{Gal}(L/K) / \text{Gal}(L/M)$  (群としての同型).