

2025年度 前期 中間試験 (問題兼解答用紙)

開講学部	評点小計
理工学部	

評点

問題枚数	両面印刷	別紙解答用紙	試験時間	試験科目名			出題者
2/4p	有	なし	80分	線形代数3 <small>火曜4時限, 教科書: Original</small>			大西良博
持込許可物件	所属学部	所属学科	学年	クラス	学籍番号(9桁)	氏名	
なし	理工学部	学科	年				

注意 1. 最終的な答に至る途中の説明をできるだけ詳しく書くこと。最終結果だけでは得点できない。  
 注意 2. 学生証, 記名用のペン, 鉛筆またはシャープペンシル, 消しゴム以外は机の上に置かないこと。  
 注意 3. 試験場の静粛を保つために, 退出は開始 60 分後の時点の一回限りとする。

注意 4. 時間の許す限り検算をせよ。  
 注意 5. **7a** と **7b** は選択問題である。どちらか 1 問選んで解答せよ。

**1** (15点)  $\mathbb{R}$  上の線形写像  $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^4$ ,  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , 但し

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & -8 & 4 & -6 & 2 \\ -4 & -5 & 7 & -2 & 6 & -7 \\ -1 & 2 & -8 & 6 & -5 & -5 \end{bmatrix}$$

について, 次を求めよ。

- (1)  $A$  の簡約化  $B$ .
- (2)  $\text{Ker}(T)$  の 1 組の基と  $\text{null}(T)$ .
- (3)  $\text{Im}(T)$  の 1 組の基と  $\text{rank}(T)$ .

**2** (15点)  $x$  は不定元とする。  $\mathbb{R}[x]_3$  の元

$$f_1(x) = 3 + 2x - 4x^2 - x^3,$$

$$f_2(x) = 1 + 4x - 5x^2 + 2x^3,$$

$$f_3(x) = 3 - 8x + 7x^2 - 8x^3,$$

$$f_4(x) = -4 + 4x - 2x^2 + 6x^3,$$

$$f_5(x) = -2 - 6x + 6x^2 - 5x^3,$$

$$f_6(x) = 2 + 2x - 7x^2 - 5x^3$$

について, これらの vectors がなす組の最大 1 次独立数  $r$  を求めよ。また  $r$  個の 1 次独立な組を, 前の方を優先して選び出し, 他の vectors をそれらの 1 次結合で表せ。 (**1** の結果を用いてよい。)

3 (15点) 正方行列  $A$  が与へられ, その固有多項式が

$$\varphi_A(t) = (t-1)^2(t+1)$$

であるとせよ. このとき,  $A^{2025}$  を整数係数の  $A$  の 2 次以下の多項式で表せ.

4 (15点) 線形変換  $T: \mathbb{R}[x]_2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_2$ ,

$$T(f(x)) = f''(x)x + 2f'(x)(x-1) + f(x-2) + f(2)x$$

について, 次の 3 つを求めよ.

- (1)  $\mathbb{R}[x]_2$  の標準基  $\{1, x, x^2\}$  に関する表現行列  $A$ .
- (2)  $(1+x, -2+x, 2-x+x^2) = (1, x, x^2)P$  を満たす行列  $P$ .
- (3) 基  $\{1+x, -2+x, 2-x+x^2\}$  に関する  $T$  の表現行列  $B$ .

5 (15点)  $A = \begin{bmatrix} -3 & -4 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \in \text{Mat}(3, \mathbb{C})$  について答へよ.

- (1)  $A$  の固有多項式  $\varphi_A(t)$  を求めよ.
- (2)  $A$  は  $(\mathbb{C}$  上で) 対角化可能か. 不可能な場合は理由を述べ, 可能である場合は対角化せよ.  
(  $B = P^{-1}AP$  が対角行列となる様な  $P \in \text{GL}(3, \mathbb{C})$  を見い出せ. )
- (3)  $A^n$  を, その各成分を  $n$  の式で表して記せ.

6 (10点) 内積空間  $V$  とその部分空間  $W$  に対し

$$W^\perp = \{ \mathbf{u} \in V \mid \text{すべての } \mathbf{v} \in W \text{ に対して } (\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \}$$

と定める. これは  $W$  の直交補空間と呼ばれる. このとき

$$W \cap W^\perp = \{ \mathbf{0} \}, \quad V = W + W^\perp$$

となることを証明せよ.

7a (15 点)  $\mathbb{R}^4$  内の 3 つの vectors

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 1 \\ 14 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 12 \\ 13 \end{bmatrix}$$

に対し、この順で Gram-Schmidt の正規直交化法を行ふことにより、これらの vectors の生成する部分空間の正規直交基を 1 組与へよ。さらに、それらにもう 1 本の長さ 1 の vector を求めて、それら 4 本が全空間  $\mathbb{R}^4$  の正規直交基となる様にせよ。

7b (15 点) 次の問に答へよ。

(1) 正則行列  $A$  について  $\varphi_{A^{-1}}(t) = |A|^{-1}(-t)^n \varphi_A(1/t)$  であることを示せ。

(2) 直交行列  $A$  について  $|A| = -1$  ならば  $-1$  は  $A$  の固有値であることを証明せよ。

(Hint : 行列式が  $-1$  であるいくつかの直交行列の固有多項式を挙げておく。  $t^3 - \frac{3}{7}t^2 - \frac{3}{7}t + 1$ ,  $t^4 + \frac{4}{9}t^3 - \frac{4}{9}t - 1$ ,  $t^5 - \frac{3}{5}t^4 - \frac{2}{5}t^3 - \frac{2}{5}t^2 - \frac{3}{5}t + 1$ .)

## 記号

$\mathbb{N}$  … 自然数全体,  $\mathbb{Z}$  … 整数全体のなす環,  $\mathbb{Q}$  … 有理数全体のなす体,  
 $\mathbb{R}$  … 実数全体のなす体,  $\mathbb{C}$  … 複素数全体のなす体,  $\mathbf{K}$  … 一般の体,  $I$  … 単位行列,  
 $\text{Mat}(m, n, \mathbf{K})$  …  $m \times n$  行列,  $\text{Mat}(n, \mathbf{K})$  …  $n$  次正交代行列,  $\text{GL}(n, \mathbf{K})$  …  $n$  次正則行列.

### 既習事項のまとめ

- (1) 行列の主成分とは、各行における 0 でない最も左にある成分のことである。従って主成分が存在しない行もあり得る（つまり 0 ばかりからなる行）。
- (2) 簡約行列とは“右下りの優しい階段状”の行列であつて、主成分がすべて 1 で、主成分のある列は主成分以外はすべて 0 である様なものこと。
- (3) どんな行列も基本変形（掃き出し法）により簡約行列に変形（簡約化）でき、結果は一意的である。それにより、連立 1 次方程式を解くことができる。
- (4) Vector 空間  $V$  の部分集合  $X$  について、その中に  $r$  個の vectors からなる 1 次独立な組があり、しかも  $X$  のどんな  $r+1$  個の vectors も 1 次従属であるとき、 $r$  を  $X$  の 最大 1 次独立数 と呼ぶ。
- (5) Vector 空間  $V$  の最大 1 次独立数を与へる集合  $B$  を  $V$  の基または基底といふ。 $r$  を  $V$  の次元と呼んで  $\dim(V)$  または  $\dim V$  と記す。
- (6)  $\mathbf{K}$  上の vector 空間  $U$  から  $\mathbf{K}$  上の vector 空間  $V$  への写像  $T$  は、任意の  $c \in \mathbf{K}$  と任意の  $u_1, u_2 \in U$  に対し **L1**  $T(cu_1) = cT(u_1)$ ; **L2**  $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$  が成り立つとき、線形写像と呼ばれる。
- (7) Vector 空間  $V$  からそれ自身への線形写像を線形変換といふ。
- (8)  $\mathbf{K}$  上の vector 空間  $U$  の基  $\{u_1, \dots, u_n\}$  と vector 空間  $V$  の基  $\{v_1, \dots, v_m\}$ 、および線形写像  $T : U \rightarrow V$  が与へられたとき、 $(T(u_1), \dots, T(u_n)) = (v_1, \dots, v_m)A$  なる  $A \in \text{Mat}(m, n, \mathbf{K})$  を  $T$  のこれらの基に関する表現行列と呼ぶ。
- (9) 線形写像  $T : U \rightarrow V$  について  
 $\text{Ker}(T) = \{u \in U \mid T(u) = 0_V\}$  を  $T$  の核,  $\text{null}(T) = \dim(\text{Ker}(T))$  を  $T$  の退化次数,  
 $\text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in U\}$  を  $T$  の像,  $\text{rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$  を  $T$  の階数といふ。  
**\*** 以下  $V$  は vector 空間,  $\{u_1, \dots, u_n\}$  は  $V$  の基,  $T$  は  $V$  の線形変換であるとする。  
**\***  $A$  は  $n$  次正交代とする。
- (10)  $\varphi_A(t) = |I - A|$  を  $A$  の固有多項式と称する。
- (11)  $Au = \lambda u$  (あるいは  $T(u) = \lambda u$ ) となる scalar  $\lambda$  と  $u \neq 0$  が存在するとき、それぞれを  $A$  の (あるいは  $T$  の) 固有値, 固有値  $\lambda$  に対する固有 vector と称する。
- (12)  $W(\lambda, A) = \{u \in \mathbf{K}^n \mid Au = \lambda u\} (\subset \mathbf{K}^n)$  を  $\lambda$  に対する  $A$  の固有空間と称する。
- (13)  $W(\lambda, T) = \{u \in V \mid T(u) = \lambda u\} (\subset V)$  を  $\lambda$  に対する  $T$  の固有空間と称する。
- (14)  $\lambda$  が  $A$  の固有値であるためには  $\varphi_A(\lambda) = 0$  であることが必要十分。
- (15) Vector 空間  $V$  の線形変換  $T$ 、及び、 $V$  の適当な基に関する表現行列  $A$  に対し  $\varphi_T(t) = \varphi_A(t)$  と定め、これを  $T$  の固有多項式と呼ぶ。 $\varphi_T(t)$  は  $V$  の基の選び方に依存しない。
- (16) Cayley-Hamilton の定理 :  $\varphi_A(A) = O$ ,  $\varphi_T(T) = O$ 。
- (17) ある正則行列  $P$  が存在して  $B = P^{-1}AP$  となるとき、 $A$  と  $B$  は相似といはれる。
- (18) 正則行列  $P$  が存在して  $P^{-1}AP$  が対角行列になるとき、 $A$  は  $P$  により対角化されるといふ。またこのとき、 $A$  は対角化可能であるといはれる。 $T$  の表現行列  $A$  が対角化可能であるとき、 $T$  は対角化可能であるといはれる。
- (19) 行列  $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{C})$  について、 $A$  が対角化可能  $\iff \sum_{\lambda: A \text{ の固有値}} \dim W(\lambda, A) = n$ 。  
 但し、和は  $A$  の固有値  $\lambda$  のすべてに渡る。
- (20)  $\mathbb{C}$  上の線形変換  $T$  について、 $T$  が対角化可能  $\iff \sum_{\lambda: A \text{ の固有値}} \dim W(\lambda, A) = \dim V$ 。  
 但し、和は  $T$  の固有値  $\lambda$  のすべてに渡る。
- (21) 任意の  $u, v \in V$  に対し  $(u, v) \in \mathbb{R}$  が定められてゐて、第 1 変数についても第 2 変数についても線形性を持ち、さらに任意の  $u, v$  について  $(u, v) = (v, u)$  が成り立ち、 $(u, u) = 0 \iff u = 0$  を満たすとき、 $V$  には内積 ( ) が定められてゐるといひ、その様な  $V$  を内積空間と称する。
- (22) 内積空間  $V$  においては  $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$  なる記法を用いる。これは  $u$  の norm と呼ばれる。
- (23) 内積空間において  $(u, v) = 0$  となる vectors  $u, v$  は直交するといはれ  $u \perp v$  と記される。
- (24) 実正交代行列  $P$  は  ${}^t P P = I$  を満たすとき、直交代行列と呼ばれる。これは  $P {}^t P = I$  と同値である。
- (25) 任意の  $u, v \in V$  に対して  $(T(u), T(v)) = (u, v)$  となるとき  $T$  は直交変換であるといはれる。
- (26)  $T$  が直交変換であることと  $T$  の表現行列が直交代行列であることは同値。
- (27) 実正交代行列  $P$  が直交代行列であるためには、 $A$  の列 vectors の長さが全て 1 でかつ互ひに直交することが必要十分である。